

Retención de la placenta

Diagnosís:

Después del parto, la vaca debe expulsar su placenta. Normalmente esto pasa en unas horas. Obsérvela. Si no expulsa su placenta en 8 horas, digamos que la vaca tiene una placenta retenida.

Las causas de una placenta retenida-

- Un parto difícil, un becerro anormalmente grande
- Fiebre de leche
- Abortos, becerras muertas al nacer
- Torsión del útero
- Una deficiencia de selenio, vitaminas A o E
- Forraje de mala calidad o insuficiente forraje

Los efectos de una placenta retenida-

- Una infección uterina (**metritis**)
- Una bajada de producción de leche
- Daño al sistema de reproducción
- Una vaca muerta o inútil

Sugerencias-

- Buen manejo de las vacas secas. La comida, las vacunas, y el ambiente son importantes.
- Cuida bien a las vacas que se van a parir. Deben estar en un lugar tranquilo y limpio, sin mucho estrés.
- Sepa cuando ayudar a la vaca en la parición. Siempre use cuidado y manéjela apaciblemente.

Tratamiento:

Avísele a su supervisor

- Siempre observe las vacas frescas y note si han expulsado su placenta
- Esta finca suele de dar una dosis más de Lutalyse a la vacas que retienen su placenta
- Se usa PolyFlex para vacas con Retención de la Placenta- pero CUIDADO- una vaca tratada con antibióticos NO puede estar ordeñada al tanque.
- ESCRIBA TODA LA INFORMACION DE VACAS TRATADAS CON ANTIBIOTICOS